

**DANE PLANISTYCZNE DO ROCZNYCH PLANÓW ŁOWIECKICH
BYDGOSKI OKRĘG PZŁ**

Normy dokarmiania na 1 szt zwierzyny w RPŁ.

- jeleń 25 kg karmy treściwej 60 kg objętościowej suchej
- daniel 15 kg karmy treściwej 30 kg objętościowej suchej
- sarna 5 kg karmy treściwej 12 kg objętościowej suchej
- dzik - zakaz karmienia dzików (dozwolone jest jedynie zakładanie przynęty).
Przynęta: (niepodtrzymujące karmienia dzików): Przyciąganie dzików z ograniczoną ilością pokarmu (np. kukurydzy) wyłącznie w celu polowania, łapania w pułapkę lub strzelenia.
Maksymalna ilość karmy nie powinna przekraczać **10kg/km²/miesiąc**. (1,2 t. na każdy 1000 ha obwodu rocznie) Przynęta nie powinna w żadnym wypadku stanowić źródła żerowania dzików w celu utrzymania populacji podczas zimy
- zając 1 kg objętościowej suchej 4 kg objętościowej soczystej 5 kg snopówki
- kuropatwa 1 kg karmy treściwej 2 kg objętościowej soczystej
- bażant 2 kg karmy treściwej 5 kg objętościowej soczystej

<p>Roczne zapotrzebowanie na sól wynosi dla: jelenia ok. 3 kg, daniela 1,5—2 kg, sarny 1—1,5 kg.</p>

Opierając się na zapotrzebowaniu pokarmowym jednej sztuki przeliczeniowej (1 jeleń = 2 daniela = 5 sarn), na możliwościach pokrycia tego zapotrzebowania żerem leśnym w poszczególnych miesiącach oraz na maksymalnych możliwościach produkcyjnych poletka obliczono, że w łowisku słabym, przy stanie zwierzyny równym pojemności tego łowiska, bezwzględnie konieczne jest uprawianie 0,5 ha poletek na każde 1000 ha terenu leśnego.

Zadania do realizacji przez dzierżawców obwodów łowieckich - opcjonalnie w zależności od charakteru obwodu lub poszczególnych łowisk:

- poletka dla zwierzyny grubej stanowiące żer pniu- minimum 2 ha na każde 1000 ha powierzchni leśnej obwodu,
- pasy zaporowe wg potrzeb W zależności od rozmiaru szkód łowieckich,•
- paśniki dla jeleni -minimum 1 paśnik magazyn na.500 ha powierzchni leśnej lub 1 paśnik klasyczny na każde 10 sztuk jeleni,
- piwnice/kopce na karmę dla dzików- 1 piwnica/kopiec na każde 10 sztuk dzików,
- paśniki dla saren - 1 paśnik na każde 10 sztuk saren,
- paśniki dla zającey, podsypy dla bażantów, budki dla kuropatw - wg potrzeb,
- aktywne zagospodarowanie łąk śródleśnych i przyleśnych,
- wodopoje - zagospodarowanie naturalnych, lub budowa nowych,
- stały dostęp zwierzyny do soli,
- ambony według potrzeb,
- śródpolne poletka dla zwierzyny drobnej /żer na pniu/ - 0,05 ha na każde 1000 ha pola
- paśniki dla saren - 1 paśnik na każde 10 sztuk saren,
- paśniki dla zającey-1 paśnik na każde 100 ha pola,
- budki dla kuropatw - 1 budka: na każde 10 kuropatw,
- podsypy dla bażantów - 1 podsyp na każde 20 bażantów.

OKREŚLANIE PRZYROSTU ZREALIZOWANEGO

łoś — do 70% wiosennego stanu kłep
Jeleń szlachetny — do 70 % stanu wiosennego łań *
Daniel — do 70 % stanu wiosennego łań
Sarna do 70 % wiosennego stanu kóz *
Mouflon do 60 % wiosennego stanu owiec
Dzik — od 250 do 300 % ogólnego stanu wiosennego

uzgodniona z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich inwentaryzacja zwierzyny stanowi podstawę do określania wskaźników przyrostu zrealizowanego zwierzyny grubej.

Planowanie przyrostu zrealizowanego i pozyskania zwierzyny grubej:

Jeleń

Przyrost zrealizowany – do 70% stanu wiosennego łań (nie mniej jednak niż 35 % od ogólnej liczby jeleni)

Struktura pozyskania:

a/ w grupach płci:

byki do 50%
łanie do 60%
cielęta do 30%

b/ byki w klasach odstrzału:

odstrzał selekcyjny - do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału.
odstrzał łowny - minimum 15% liczby byków zaplanowanych do odstrzału.

Daniel

Przyrost zrealizowany – do 70% stanu wiosennego łań.

Struktura pozyskania:

a/ w grupach płci:

byki do 50 %
łanie do 50 %
cielęta do 30 %

b/ byki w klasach odstrzału:

odstrzał selekcyjny - do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanych do odstrzału.
odstrzał łowny - minimum 15% liczby byków zaplanowanych do odstrzału.

Sarna

Przyrost zrealizowany – do 70% wiosennego stanu kóz (w obwodach leśnych nie więcej niż 20 % ogólnej liczby sarny)

Struktura pozyskania:

a/ w grupach płci:

rogacze do 50 %
kozy do 50 %
koźłeta do 30 %

b/ rogacze w klasach odstrzału:

odstrzał selekcyjny - do 70 % ogólnej liczby rogaczy zaplanowanych do odstrzału.
odstrzał łowny - minimum 30 % liczby rogaczy zaplanowanych do odstrzału.

Mouflon

Przyrost zrealizowany – do 60% wiosennego stanu owiec

Struktura pozyskania:

a/ w grupach płci:

owce – do 50%,

tryki – do 50%,

jagnięta – do 30%.

b/ tryki w klasach odstrzału:

odstrzał selekcyjny – do 50% ogólnej liczby tryków zaplanowanych do odstrzału.

odstrzał łowny - minimum 50% ogólnej liczby tryków zaplanowanych do odstrzału

Dzik

Przyrost zrealizowany nie mniej niż 250 % ogólnego stanu wiosennego populacji.

Drapieżniki

Przyrost zrealizowany 115 a 130% stanu wiosennego

Zając

Przyrost zrealizowany – 20,9% /100 ha stanu wiosennego

Planując przyrost zrealizowany niezbędnym jest ujęcie skali ubytków tj. zdarzeń komunikacyjnych oraz drapieżnictwa wilków, udokumentowanych w nadleśnictwie.

W odniesieniu do zwierzyny drobnej należy przyjąć następujące parametry:

- a. **w przypadku zająca**, w przeliczeniu na 100 ha powierzchni polnej obwodu:
- przy stanie do 5 szt. - 0 % pozyskania,
 - przy stanie 5-10 szt. - plan pozyskania do 10 % stanu wiosennego,
 - przy stanie 10-20 szt. - plan pozyskania do 15 % stanu wiosennego,
- b. **w przypadku bażanta:**
- na terenach obwodów na których nie prowadzi się zasiedleń – plan pozyskania do 20 % stanu wiosennego,
 - na terenie obwodów na których prowadzi się zasiedlenie (po uzyskaniu zgody właściwego ministra) - plan pozyskania do 50 % ilości zasiedlonych ptaków + do 20 % stanu wiosennego,
- c. **w przypadku kuropatwy:**
- pozyskanie kontrolne, maksimum do 5 % stanu wiosennego.
- d. **lisy** - **plan pozyskania 100-200 % stanu wiosennego,**
- e. **jenoty** - plan pozyskania 100-200 % stanu wiosennego,
- f. **borsuki** - plan pozyskania do 100 % stanu wiosennego,
- g. **kuny** - plan pozyskania do 100 % stanu wiosennego,
- h. **tchórze** - plan pozyskania do 100 % stanu wiosennego,
- i. **norki amerykańskie** - plan pozyskania do 100 % stanu wiosennego,
- j. **szop pracz** - plan pozyskania do 100 % stanu wiosennego,
- k. **piżmaki, dzikie gęsi, dzikie kaczki słonki, jarząbki, gołębie grzywacze, łyski** – plan pozyskania na poziomie ostatnich lat.

Zastosowanie odpowiednich wskaźników pozyskania winno być celowym dążeniem do osiągnięcia stanów docelowych, określonych w WŁPH.